

September/Anfang Oktober. Dabei handelt es sich um verfrüht ausgeflogene Käfer. Die Verbindung mit Komposthaufen eröffnet die Möglichkeit einer gezielten Förderung der Art auch in städtischen Bereichen.

### Literatur

- HARDE, K. W. & F. SEVERA 1981: Der Kosmos-Käferführer. – Franckhsche Verlagshandlung, Stuttgart.  
 HOFFMANN, E. 1883: Der Käfersammler. – Reprint Vlg., Leipzig.  
 KLAUSNITZER, B. 1981: Wunderwelt der Käfer. – Herder, Freiburg.  
 REITTER, E. 1908: Fauna Germanica Käfer. Bd. 2. – W. G. Lutz, Stuttgart.  
 SAUER, F. 1993: 600 Käfer. – Fauna Vlg. Karlsfeld.  
 ZAHRADNIK, J. 1982: Der Kosmos-Insektenführer. – Franckhsche Verlagshandlung, Stuttgart.  
 -- 1985: Käfer Mittel- und Nordwesteuropas. – Parey, Hamburg.

Adresse des Autors:

Prof. Dr. Josef H. REICHHOLF  
 Zoologische Staatssammlung, Münchhausenstr. 21, D-81247 München

## Käferfunde aus dem Landkreis Neuburg/Schrobenhausen und Umgebung Teil 2

(Coleoptera)

Erwin WEICHSELBAUMER

Der erste Teil der Käferfunde aus dem Raum Neuburg/Schrobenhausen erschien im Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen 52(1/2) 2003, S. 24-34. Er umfaßt die Familien der Carabidae, Haliplidae, Dytiscidae, Gyrinidae, Hydraenidae, Spercheidae, Georissidae, Hydrophilidae, Histeridae, Sphaeritidae, Silphidae, Agyrtidae, Leptinidae, Cholevidae, Leiodidae, Scydmaenidae, Ptilidae, Staphylinidae, Pselaphidae, Cantharidae, Drilidae, Malachidae, Cleridae, Trogostidae, Lymexylonidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae, Throscidae und Buprestidae.

Ebenso ist dort die Beschreibung des Sammelgebietes, die Sammelmethode, Zusammenfassung, Dank und das Literaturverzeichnis zu entnehmen.

### Ergebnisse (Teil 2)

**W:** Wiederfunde für Bayern. Nachweise, die seit 1950 oder noch länger nicht mehr gemeldet wurden. Im Vergleich mit dem Verzeichnis der Käfer Deutschlands von KÖHLER und KLAUSNITZER (1998).

**Urwaldrelikt:** Altholzbewohner, die in alten urständigen Wäldern oder in verbliebenen Solitärbäumen ihre Verbreitung haben. (SCHIMMEL 1989) (s. Teil 1)

**RL1-RL4R:** Einordnung nach der "Roten Liste der Käfer Deutschlands" (GEISER 1997)

**RL1-RL4R/Bay:** Einordnung nach der "Roten Liste der Käfer Bayerns" (HEBAUER 1992)

**RL1:** Vom Aussterben bedroht

**RL2:** Stark gefährdet

**RL3:** Gefährdet

**RL4R:** Potentiell gefährdet durch Rückgang

**V:** Vorwarnliste. Arten die nicht in allen Teilen Deutschlands einer aktuellen Gefährdung unterliegen.

### Eucinetidae

*Eucinetus haemorrhoidalis* (GERM., 1818), Schrobenhausen, Freinhausen, 24.3.1990 und 30.5.1990, je 1 Ex. in Bodenstreu und gekeschert. **RL 3**

### Elmidae

*Esolus parallelepipedus* (MÜLL., 1806), Langenmosen, Grundwassertümpel, 26.3.2000, 1 Ex. gekeschert. *Riolus cupreus* (MÜLL., 1806), Bergheim, Donauzufluß, 10.9.1999, 5 Ex. an untergetauchtem Holz. **RL 3** *Riolus subviolaceus* (MÜLL., 1817), Bergheim, Donauzufluß 10.9.1999, 2 Ex. an untergetauchtem Holz, **RL 3**, zusammen mit *Oulimnius tuberculatus* (MÜLL.).

*Macronychius quadrituberculatus* MÜLL., 1806, Staustufe Bergheim, Donauzufluß, an untergetauchtem Baumstamm im verblockten Mündungsbereich, 18 Ex., am 8.9.1999. Nach über hundert Jahren (um 1875 von KITTEL aus der Umg. Passau gemeldet) wird die Art neuerdings aus verschiedenen Gegenden Südbayerns nachgewiesen. Isarmündung am Grieshaus 15.6.1996, Unterlauf der Vils an der Grafenmühle bei Vilshofen, 30.5.1983 u. 2.6.1983 (Schriftliche Mitteilung F. HEBAUER). **RL 2**

### Limnichidae

*Pelochares versicolor* (WALTJ., 1838), Weicheringer See, vom 28.6.-7.7.1995, 10 Ex. an kiesiger, spärlich bewachsenen Uferstelle, in Gesellschaft mit *Limnichus sericeus* (DUFT.). **RL 2**

### Dermestidae

*Dermestes bicolor* F., 1781, Schrobenhausen, 28.6.1999, 2 Ex. an Taubenmist.

*Megatoma undata* (L., 1758), Zell, Rohrenfeld, 20.3.1997, 10.2.1999, in Anzahl aus eingetragenen und mit Hymenopteren besetztem Buchenholz gezüchtet. **RL 3**.

*Globicornis nigripes* (F., 1792), Bruck, 15.5.2000, 1 Ex. von blühenden Gesträuch geklopft. **RL 3**.

*Trinodes hirtus* (F., 1781), Solitäre Kopfweiden bei Bergheim, 20.7.1996, 5 Ex. unter loser Rinde in Spinnweben. **RL 3**.

### Nosodendridae

*Nosodendron fasciculare* (OL., 1790), Bergheim, 26.4.1998, 3.5.1998 beide Male zahlreich an blutendem Feldahorn. **RL 3**.

### Byrrhidae

*Simplocaria maculosa* ER., 1847 Neuburg, 1 Ex. im Hochwassergenist der Donau. **RL 2**.

*Morychus aeneus* (F., 1775) Bergheim, 3.6.1995, 1 Ex. im Spülsaum einer überschwemmten Kiesgrube (det. KÖHLER).

### Cerylonidae

*Cerylon deplanatum* GYLL., 1827, Bergheim, 14.3.1998, 2 Ex. unter Eichenrinde. **RL 3**.

### Sphaerosomatidae

*Sphaerosoma globosum* (STURM, 1807), Grünau, 23.3.1997, 1 Ex. aus Haselnußlaub gesiebt. **RL 3**.

### Nitidulidae

Verschleppte oder mittlerweile eingebürgerte Arten (Adventiv-Arten) in Schrobenhausen und Umgebung, an Getreideabfällen und in Komposthaufen.

*Carpophilus hemipterus* (L., 1758), 7. 7.2000.

*Carpophilus marginellus* MOTSCH., 1858, 1.11.1997.

*Carpophilus truncatus* MURRAY, 1864, 15.8.1997, (alle Tiere det. J. JELINEK/Prag).

*Meligethes egenus* ER., 1845, Schrobenhausen, 27.8.1999, 10 Ex. auf Minze (Wiesenbach). **RL 3**.

*Epuraea guttata* (OL., 1811), Gerolfing, 12.6.1997, 1 Ex. in der Dämmerung gekeschert.

*Thalycra fervida* (OL., 1790), Schrobenhausen, 30.6.2002, 1 Ex. bei Weichselbaumer am Haus in der Dämmerung geschwärmt.

**Monotomidae**

*Monotoma conicicollis* AUBÉ, 1837, Bergheim, 8.3.2001, in Anzahl bei *Formica* spec. zusammen mit *M. angusticollis* (GYLL.).

*Monotoma brevicollis* AUBÉ, 1837, Edelshausen, 1.11.1997 1 Ex. aus schimmeligem Getreide gesiebt.

**Silvanidae**

*Airaphilus elongatus* (GYLL., 1813) Bergheim, 8. 2.2001, 24.2.2001, 3 Ex. in angehäuften schimmeligem Mähgut. **RL2.**

**Biphyllidae**

*Diplocoelus fagi* GUER., 1844, Brunnen, 5.8.1995, 1 Ex. von dünnen Ast geklopft.

**Cryptophagidae**

*Cryptophagus subdepressus* GYLL., 1827, Schrobenhausen, 5.8.1988, 1 Ex. von Kiefern geklopft.

*Cryptophagus fuscicornis* STURM, 1845, Bergheim, 20.12.1997, 1 Ex. im Mulm von hohler Ulme. **RL2.**

*Cryptophagus saginatus* STURM, 1845 Gerolfing, 12.12.1999, 4 Ex. im Bodenmulm einer freistehenden Eiche (det. ESSER).

*Cryptophagus sporadium* BRUCE, 1934, Schrobenhausen, 4.11.1997, Feldscheune, 2 Ex. aus schimmeligem Stroh gesiebt. (det. FRANZEN). **RL3.**

*Micrambe abietis* (PAYK., 1798), Bergheim, 5.9.1999, 1 Ex. aus schimmeligem Heu gesiebt (det. ESSER).

*Antherophagus nigricornis* (F., 1787), Zuchering, 4.7.2001, Truppenübungsplatz, 1 Ex. von blühenden Gesträuch geklopft.

**Laemophloeidae**

*Notolamprolatus castaneus* (ER., 1845), Rohrenfeld, 1 Ex. am 3.7.1999 ex larva aus Eichenwipfelast. **RL1.** Aktuelle Meldung für Nordbayern: Umg. Bad Windsheim, Kehrenberg, 2 Ex. 26.7.1998 geklopft von Ästen einer randständigen Huteeiche; Uffenheim, Hohenlandsberg, 1 Ex. 2.8.2000 Baumkronenbenebelung Eiche, leg. H. BUSSLER (BUSSLER i.l. 2002 ).

*Leptophloeus juniperi* (GROUV., 1874) Rohrenfeld, 23.5.1996 1 Ex. in Wacholderästen mit *Phymatodes glabratus* (CHARP.), am 12.4.2000 in Anzahl aus eingetragenen Ulmenästen gezogen zusammen mit *Scolytus pygmaeus* (F.) und *S. multistriatus* (MARSH.). **RL2W.**

*Leptophloeus clematidis* (ER., 1846), Bergheim, 23.9. 1995, in Anzahl aus Waldrebe geklopft.

*Lathropus sepicola* (MÜLL., 1821), Rohrenfeld, 3.7.1999, 5 Ex. aus eingetragenen Eichenwipfelästen gezogen. **RL2.**

**Latridiidae**

*Latridius hirtus* (GYLL., 1827), Bergheim, 14.3.1998, 1 Ex. unter loser Eichenrinde. **RL3.**

*Corticaria longicornis* (HBST., 1793), Bergheim, 16.2.2001, 24.2.2001, 26.2.2001, 10 Ex. in gehäuften schimmeligen Mähgut. (det. RÜCKER). Nach zahlreich korrigierten Falschmeldungen aus Deutschland ist dies der erste gesicherte Nachweis. Die Einstufung in der Roten Liste (RL 2) beruht auf diesen Falschmeldungen. **Neu für Deutschland!**

**Mycetophagidae**

*Mycetophagus piceus* (F., 1792), Grünau, 22.3.1996, 1 Ex. unter verpilzter Eichenrinde. **RL3.**

*Mycetophagus populi* F., 1798, Neuburg, 29.10.2002, überwinterte Tiere zahlreich in morschem, verpilzten Holz einer hohlen Hainbuche. **RL2.**

**Colydiidae**

*Synchita mediolanensis* VILLA, 1833, Zell, 17.4.1997, 1 Ex. aus eingetragenen Buchenholz gezogen. **RL1.**

*Colydium elongatum* (F., 1787), Rohrenfeld, 25.2.1996, in Anzahl unter der Rinde und im Stammholz einer gefällten Eiche. **RL3.**

**Corylophidae**

*Sacium pusillum* (GYLL., 1810), Rohrenfeld, 3.7.1999, 5 Ex. aus Eichenwipfelästen gezogen. **RL2W.**

**Endomychidae**

*Symbiotes latus* REDT., 1849, Grünau, 26.3.1996, 1 Ex. unter loser Eichenrinde. **RL2.**

**Coccinellidae**

*Scymnus ater* KUG., 1794, Schrobenhausen, 20.2.1988, 1 Ex. unter loser Pappelrinde (det. FÜRSCHE) **RL2**.  
*Nephus quadrimaculatus* (HBST., 1783), Gerolfing, 28.11.1999, 1 Ex. unter loser Rinde einer abgestorbenen Ulme. **RL3**.

*Hippodamia notata* (LAICH., 1781), Edelshausen, Brunnen, 30.6.1988, 1 Ex. und am 19.9.1987, 3 Ex. gekeschert. **RL3**.

*Coccinella hieroglyphica* L., 1758, Brunnen, 21.9.1987, 2 Ex. auf jungen Kiefern. **RL3**.

*Halysia sedecimguttata* (L., 1758), Bergheim, 26.4.2001, Auwald, 1 Ex. gekeschert. **RL3**.

**Cisidae**

*Enneathron pruinosulum* (PERRIS, 1864), Rohrenfeld, 3.7.1998, 1 Ex. aus Eichenast gezüchtet. **RL2**. (det. Reibnitz).

*Ropalodontus perforatus* (GYLL., 1813), Neuburg, 9.3.2002, 1 Ex. in *Fomes spec.* an Windbruch geschädigter Buche. **RL3**.

**Bostrychidae**

*Rhizophorthera dominica* (F., 1792), Schrobenhausen, 22.7.1994, 10.5.1998, in Anzahl an Getreideresten.

**Anobiidae**

*Dryophilus pusillus* (GYLL., 1808), Schrobenhausen, 6.5.1990, 1 Ex. von Fichte geklopft.

*Oligomerus brunneus* (OL., 1790), Bergheim, 18.7.1996, in Anzahl an der Rinde und im morschen Holz von Kopfweiden. **RL3**.

*Gastrallus immarginatus* (MÜLL., 1821), Bergheim, 20.6.1998, zahlreich aus eingetragener Feldahornrinde gezogen. **RL3**.

*Gastrallus laevigatus* (OL., 1790), Rohrenfeld, 3.7.1999, 1 Ex. aus eingetragenen Eichenwipfelast gezogen. **RL2**.

*Xyletinus ater* (CREUTZ., 1796), Umg. Neuburg, 2.6.1989, 1 Ex. auf Eichengebüsch.

*Dorcatoma dresdensis* Hbst., 1792, Gerolfing, 1.2.1999, 1 Ex. in *Fomes spec.* **RL3**.

**Ptinidae**

*Tipmus unicolor* (PILL. MITT., 1783) Gerolfing, 28.11.1999, 1 Ex. unter loser Rinde einer abgestorbenen Ulme.

*Ptinus raptor* STURM, 1837, Schrobenhausen, 4.4.1988, 1 Ex. an der Hauswand. (det. EIFLER).

*Ptinus sexpunctatus* PANZ., 1795, Schrobenhausen, 10.6.1989 1 Ex. an der Hauswand. **RL3**.

*Ptinus dubius* STURM, 1837, Schrobenhausen, 9.5.1990, 2 Ex. von blühenden Kiefern geklopft.

*Ptinus subpilosus* STURM, 1837, Bergheim, 2.3.2001, 1 Ex. unter der losen Rinde einer abgestorbenen Ulme, Gollingkreut, 28.10.1990, 1 Ex. im Mulm einer etwa 1000 jährigen Eiche.

**Oedemeridae**

*Ischnomera sanguinicollis* (F., 1787), Bergheim, 17.5.1990, 1 Ex. von blühendem Weißdorn geklopft, am 20.12.1997 überwinternde Tiere zahlreich in morschem Holz einer anbrüchigen Ulme. **RL3**.

*Ischnomera caerulea* (L., 1758), Umg. Neuburg, Grünau, 28.5.1997, 1 Ex. von Weißdorn geklopft, Rohrenfeld, 25.2.1996, 1 Ex. in faulem Astloch einer abgestorbenen Ulme. **RL3**.

*Anogcodes rufiventris* (SCOP., 1763), Rohrenfeld, 14.6.1996, 3 Ex. auf Schirmblüten. **RL3**.

*Anogcodes ustulata* (F., 1787) Schrobenhausen, 21.7.1987, 18.7.1988, 2 Ex. auf Schirmblüten. **RL3**.

**Scaptiidae**

*Scaptia fuscula* MÜLL., 1821, Rohrenfeld, 28.5.1998, 2 Ex. aus dem morschem Holz einer hohlen Eiche gesiebt, 13.7.1996, 7.6.1997 an Waldwegen gekeschert. **RL3**.

**Aderidae**

*Aderus populneus* (CREUTZ., 1796), Rohrenfeld, 12.12.1997, an alter freistehende Eiche in Anzahl aus Mulm und Bodenstreu gesiebt. **RL3**.

*Euglenes oculatus* (PAYK.), Bruck, 20.5.2000, 1 Ex. von blühendem Faulbaum geklopft. (det. KÖHLER). **RL2**.

**Meloidae**

*Meloe violaceus* MARSH., 1802, Bergheim, 17.5.1996, 11.5.1997, 2 Ex. am Donauradweg. **RL3**.

*Meloe rugosus* MARSH., 1802, Bergheim, 30.9.1995, "Felberschütt", 35 Ex. auf schütter bewachsenen Stellen (Wegränder, Maulwurfshügel) zusammen mit F. BAUER. Donaudamm bei Neuburg, 14.10.2001, 3 Ex. **RL1**.

### Rhipiphoridae

*Meteocus paradoxus* (L., 1761), Brunnen, 3.10.1988, 1 Ex. am Einflugloch eines Erdwespen-Nestes (*Vespa vulgaris*). **RL3**.

### Mordellidae

*Mordellistena inexpectata* ERM., 1967, Pobenhausen, 24.6.2000, 1 Ex. auf Schafgarbe (det. KÖHLER). **RL2**.  
**Neufund für Bayern!**

### Melandryidae

*Orchesia fasciata* (ILL., 1798), Kochheim, 13.8.1998, 3 Ex. von dünnen verpilzten Ästen geklopft. **RL3**.  
*Orchesia undulata* KR., 1853, Brunnen, 5.8.1995, 2 Ex. von dünnen verpilzten Ästen geklopft.  
*Xylita laevigata* (HELL., 1786), Schrobenhausen, 2.4.1993, 1 Ex. unter loser Rinde von Kiefernstumpf, Brunnen, 30.4.1987, 3 Ex. auf Holzklafter. **RL2**.  
*Serropalpus barbatus* (SCHALL., 1783), Rohrenfeld, 14.10.1996, 1 Ex. Fragment aus Schlupfloch einer gelagerten Fichte gezogen.  
*Hypulus quercinus* (QUENSEL, 1790), Rohrenfeld, 28.2.1996, 1.3.1996, in Anzahl in weißfaulen, mit gelbem Pilzmycel durchzogenen zähen Eichenstümpfen. **RL2**.  
*Melandrya dubia* (SCHALL., 1783), Zell, 2.4.1997, 2 Ex. aus eingetragenen Laubholzästen gezogen. **RL2**.  
*Melandrya caraboides* (L., 1761), Rohrenfeld, 18.5.1996, Auwald, 1 Ex. im Fluge gefangen. **RL3**.  
*Osphyra bipunctata* (F., 1775), Umg. Neuburg, Bergheim, 11.6.1987, 13.7.1996, 7.6.1997, regelmäßig und oft in Anzahl auf Weißdorn. leg. BUSSLER 16.5.1994 20 Ex. auf Weißdorn. **RL2**.

### Tetatomidae

*Tetrotoma ancora* F., 1790, Kochheim, 11.6.1995, 2 Ex. am Waldrand von dünnen verpilzten Ästen geklopft. **RL3**.

### Alleculidae

*Allecula morio* (F., 1787), Bergheim, 11.7.1996, 14.7.1996, 20.7.1996, abends in Anzahl an abgestorbenen Kopfweiden und Kopfulmen. Gollingkreutz, 1 Ex. am 7.7.1990 im Mulm einer etwa 1000 jährigen Eiche. **RL3**.  
*Prionychius ater* (F., 1775), Bergheim, 12.7.1996, 2 Ex. abends an hohlen Kopfweiden. Bergheim, 24.6.1997 ex larva zahlreich aus dem Mulm einer Kopfulme. **RL3**.  
*Pseudocistela ceramboides* (L., 1761), Brunnen, 4.6.1992, 4 Ex. am Waldrand von Kiefern geklopft. Rohrenfeld, 1 Ex. am 20.4.1998 ex larva aus hohler freistehender Eiche. **RL3**.  
*Hymenalia rufipes* (F., 1792), Schrobenhausen, 10.7.1994, 1 Ex. von Eiche geklopft. **RL2**.  
*Mycetochara linearis* (ILL., 1794) Rohrenfeld, Bergheim, 1.3.1999, 10.4.2001, in Anzahl aus dem anbrüchigem Holz von Buchen und Ahorn gezogen in Gesellschaft von *Tillus elongatus* (L.) und *Anobiidae* – spec.

### Tenebrionidae

*Platydemus violaceum* (F., 1790), Brunnen, 19.2.1995, 1 Ex. unter verpilzter Kiefernrinde. **RL3**.  
*Pentaptyllus testaceus* (HELLW., 1792), Rohrenfeld, 12.12.1997, 29.8.2000, zahlreich in trockenem rotfaulem Eichenast. **RL3**.  
*Corticus unicolor* (PILL. MITT., 1783), am 22.3.1996 und 8.9.1989 5 Ex. unter der Rinde von gelagerten Eichenstämmen.  
*Corticus bicolor* (OL., 1790), Gerolfing, 28.11.1999, 5 Ex. unter der Rinde von abgestorbener Ulme. **RL3**.  
*Corticus fasciatus* F., 1790 Rohrenfeld, 14.3.1996, 4.10.1997, 4 Ex. unter der Rinde von gelagerten Eichenstämmen. **RL2**.  
*Palorus depressus* (F., 1790), Schloss Grünau, 22.3.1996, 11.4.1996, 27.3.1998, 5 Ex. unter der Rinde von gelagerten Eichenstämmen. **RL3**.  
*Ulloma rufa* (PILL. MITT., 1783), Brunnen, 13.6.1992, in Anzahl in verpilztem Kiefernstumpf. **RL2**.

### Geotrupidae

*Odontaeus armiger* (SCOP., 1772), Schrobenhausen, 26.7.1986, 1 Ex. Lichtenflug. **RL3**.  
*Geotrupes spiniger* (MARSH., 1802), Schrobenhausen, 25.8.1990, in Anzahl an Kuhdung. **RL3**.

**Scarabaeidae**

- Copris lunaris* (L., 1758), Rennertshofen, 21.4.1989, 10. Ex. an Schafdung. **RL2**.
- Onthophagus illyricus* (SCOP., 1763), Bergheim, 10.9.1995, Donaudamm, 1 Ex. an Schafdung. **RL3**.  
**Neufund für Bayern!**
- Onthophagus taurus* (SCHREB., 1759), Schrobenhausen, 24.8.1990 und am 17.9.1995 in Anzahl auf Pferde- und Kuhdung. **RL3**
- Onthophagus verticiorius* (LAICH., 1781) Rennertshofen, 5.5. 1989, 10 Ex. und am 23.4.2000, 13 Ex. auf Schafdung. **RL3**.
- Aphodius arenarius* (OL., 1789), Bergheim, 25.4.2001, in Anzahl an Kaninchenaborten, ebendort leg. D. JUNGWIRTH. **RL2**.
- Aphodius luridus* (F., 1775), Rennertshofen, 21.4.1989, 5.5.1989, 9 Ex. auf Schafdung mit einer Häufung der schwarzen Form *A. nigripes*.
- Aphodius paracoenosus* BALTH. HRUB., 1960, Bergheim, 30.4.2001, 4 Ex. an Schafdung, die Verbreitung der Art noch ungeklärt, (det. SCHAFFRATH). **RL1**. **Neufund für Bayern!**
- Aphodius nemoralis* ER., 1848, Brunnen, 17.5. 1989, Waldlichtung, 1 Ex. an Fuchslosung.
- Aphodius plagiatus* (L., 1767), im Spülsaum überschwemmter Kies- und Sandgruben, Schrobenhausen, 1.5.1988, 27.5.1988, 20.4.1993, 3 Ex Bergheim, 14.5.1988, 3.6.1995, 2 Ex. **W**.
- Euheptaulacus villosus* (GYLL., 1806), Bergheim, 14.6.1998, in Anzahl an Trockenhang nachmittags gekeschert. **RL2**.
- Maladera holosericea* (SCOP., 1772), Bergheim, Trockenhang "Hohenlohe", 2.4.2000, zahlreich in den Abraumhügeln von Kaninchenbauten verborgen. **RL3**.
- Rhizotrogus aestivus* (OL., 1789), Joshofen, 21.4.2002, sehr zahlreich an sonnenexponiertem Jurasüdhang in der Dämmerung geschwärmt, zusammen mit F. BAUER, ebendort leg. D. JUNGWIRTH. **RL3**.
- Melolontha hippocastani* F., 1801, Bergheim, 7.5.1996, Auwald, 1 Ex. von Eiche geklopft.
- Polyphylla fullo* (L., 1758), Freinhausen, 4 Ex. am 12.7.1997, in der fortgeschrittenen Dämmerung in einer Sandgrube, zusammen mit F. BAUER, ebendort leg. J. ROPPEL, D. JUNGWIRTH. **RL2**.
- Hoplia praticola* DUFT., 1805, Bergheim, am 6.6.1987 6 Ex. und am 18.5.1989 2 Ex. auf Weißdorn. 1 Weibchen am 18.5.1986 tot in einer Regenlache. **RL3**.
- Protaetia aeruginosa* (DRURY, 1770), Bruck / Rothheim, 21.9.1997, 2 Fragmente am Fuß einer Eiche tot aufgefunden, zusammen mit F. Bauer. **RL1**.
- Protaetia fieberi* (KR., 1880), Rohrenfeld, 9.6.1996, 1 Ex. im Fluge gefangen, in rotfauler Asthöhle einer gefällten Eiche, 2 Ex. am 28.9.1999, 14.9.2000 ex larva. **RL2**.
- Protaetia lugubris* (HBST., 1786), Bergheim, 1.9.1996, ex larva in Anzahl aus dem Mulm von hohlen Kopfweiden, leg. BUSSLER 1 Ex. am 7.6.1993 an gelagerter Eiche. **RL2**.
- Osmoderma eremita* (SCOP., 1763), Bergheim, in Anzahl im Mulm von hohler Kopfulme, 25.6.1997, ex larva. **RL2**. (s. Abb. 1)

**Lucanidae**

- Lucanus cervus* (L., 1758), Bergheim, 25.6.1997, 4 Ex. nachmittags und in der Dämmerung am Stamm einer abgestorbener Kopfulme, zusammen mit F. BAUER. **RL2**.
- Dorcus parallelipedus* (L., 1758), Umg. Neuburg, Rohrenfeld, Edelshausen, 13.7.1989, 2.2.1994, 11.6.1996, 12.7.1996, zahlreich in Eiche, Pappel und Weidenholz, die häufigste Lucanidenart in der Region.
- Sinodendron cylindricum* (L., 1758), Bergheim, 12.7.1996, recht zahlreich im rotfaulen Holz abgestorbener Kopfweiden in Gesellschaft mit *Dorcus parallelipedus* (L.). Neuburg, 9.3.2002, 1 Ex. in anbrüchiger Buche. **RL3**.
- Platycerus caraboides* (L., 1758), Umg. Neuburg, 9.5.1987, 9 Ex. auf blühendem Ahorn. Rohrenfeld, 6.5.1996, 1 Ex. von blühender Eiche geklopft. Rohrenfeld, 25.10.1997, 1 Ex. in rotfaulem Buchenstumpf. Neuburg, 9.3.2002, 1 Ex. in rotfaulem Eichenstumpf.

**Cerambycidae**

- Rhagium sycophanta* (SCHRK., 1781), Umg. Neuburg, 29.6.1987, 2 Ex. 17.5.1996, 6 Ex. auf gelagerten Eichenstämmen. **RL3**.
- Stenocorus quercus* (GÖTZ, 1783), Bruck, 14.5. bis 20.5.2001, 12 Ex. an blühendem Weißdornbusch, der von 3 mächtigen Eichen flankiert wird, ebendort leg F. BAUER. **RL2**.
- Grammoptera abdominalis* (STEPH., 1831), Rohrenfeld, 21.3.1998, aus eingetragenen Eichenwipfelästen gezogen, am 17.5.2001 1 Ex. von Weißdorn geklopft.



**Abb. 1.** Abgestorbene Kopfulme im Auwald; im gemeinsamen Lager der Mulmpartie *Elater ferrugineus* (L.) und *Osmoderma eremita* (SCOP.).

- Leptura arcuata* (PANZ., 1793), Umg. Neuburg, 22.6.1987, 6 Ex. auf Schirmblüten. leg. BUSSLER 5 Ex. am 8.6.1993 auf Schirmblüten. **RL 3.**
- Anoplodera rufipes* (SCHALL., 1783), Umg. Neuburg, 18.5.1989, 13.6.1987, 20.5.1997, je 1 Ex. auf Weißdorn. **RL 3.**
- Anoplodera sexguttata* (F., 1775), Umg. Neuburg, 27.6.1988, 2 Ex. auf Schirmblüten. **RL 3.**
- Pedostrangalia revestita* (L., 1767), Umg. Neuburg, 17.5.1990, 1 Ex. am Waldrand im Gras nach einem Gewitter. HORION: "nach starken Gewitterstürmen von Gräsern unter Eichen zu kätschern oder von den unteren Ästen zu klopfen." **RL 2.**
- Cerambyx scopoli* FUESSL., 1775, Rohrenfeld, 6.5.1996, 3 Ex. von Wacholder geklopft. **RL 3.**
- Obrium cantharinum* (L., 1767), Zuchering, 15.6.1998, in Anzahl aus Espenast gezogen. **RL 2.**
- Molorchus umbellatarum* (SCHREB., 1759), Schrobenshausen, 26.6.1990, 1 Ex. auf Schafgarbe.
- Rhopalopus femoratus* (L., 1758), Rohrenfeld, 21.6.1996, 1 Ex. im Auwald gekeschert. leg. Bussler, 1 Ex. am 15.1994 ex larva aus Haselast. **RL 3.**
- Phymatodes glabratus* (CHARP., 1825), Rohrenfeld, 20.8.1996, 4 Ex. aus eingetragenen Walcholderästen gezogen. **RL 2.**
- Xylotrechus rusticus* (L., 1758), Rohrenfeld, 10.6.1996, auf gelagerten Espenstämmen. **RL 2.**
- Clytus tropicus* PANZ., 1795, Rohrenfeld, 21.3.1998, 20.1.1999, in Anzahl aus eingetragenen Eichenwipfelästen gezogen. **RL 2.**
- Clytus lama* MULS., 1847, Brunnen, 17.5.1998, 10. Ex aus Fichtenstamm gezogen, nach Horion (1974) "eine montane bis subalpine Art" (Fundort 391 m ü. NN).
- Chlorophorus figuratus* (SCOP., 1763), Neuburg, 9.5.1988, 11.6.1988, 2 Ex. auf Schirmblüten. **RL 2.**
- Lamia textor* (L., 1758), Bergheim, 26.5.1987 und 23.4.1999 2 Ex. an den unteren fingerdicken Zweigen von Stauchweiden, ebendort leg. F. BAUER, D. JUNGWIRTH. **RL 2.**

- Monochamus galloprovincialis* (OL., 1795), Bergheim, 3 Ex. am 25.5.1999 und 30.5.2000 ex larva aus Kiefernwpfelästen. **RL3**.
- Mesosa curculionides* (L., 1761), Rohrenfeld, 1 Ex 20.8.1996 aus Eichenwpfelast gezogen. **RL 2**. Letzte Meldung für Bayern: HORION, 1 Ex. 1960 Sommer leg. auf dem Waldfriedhof/München (WITZGALL i. l. 1973).
- Mesosa nebulosa* (F., 1781), Rohrenfeld, 2 Ex. am 21.3.1998 und 10.2.1999 aus Eichenästen gezogen. **RL3**.
- Oplasia fennica* (PAYK., 1800), Grünau, 22.4.1997 und 25.2.1999 15 Ex. aus am Boden liegenden Lindenästen gezogen, die häufig im Gras eingewachsen waren. **RL2**.
- Anaesthetus testacea* (F., 1781), Rohrenfeld, 1.3.1999 1 Ex. aus Eichenästen gezogen. **RL3**.
- Pogonocherus decoratus* FAIRM., 1855, Bergheim, "Felberschütt", 1.7.2000 1 Ex. aus Kiefernast gezogen.
- Exocentrus adpersus* MULS., 1846, Rohrenfeld, 3.7.1998 und 1.3.1999 3 Ex. aus Eichenwpfelästen gezogen. **RL3**.
- Exocentrus lusitanus* (L., 1767), Grünau, 3 Ex. am 21.5.1999 ex larva aus Lindenästen. **RL3**.
- Exocentrus punctipennis* MULS. GUILB. 1856, Grünau, 14.4.1997 2 Ex. aus Ulmenästen gezogen. **RL2**.
- Agapanthia violacea* (F., 1775), Rohrenfeld, 12.6.2001, 4 Ex. an *Knautia arvensis*, die Käfer an den unteren Stengelpartien der Futterpflanze.
- Saperda perforata* (PALL., 1773), Zuchering, 6.5.1998, in Anzahl aus eingetragenen Ästen einer vom Sturm gefällten Espe gezogen. **RL2**.
- Menesia bipunctata* (ZOUBK., 1829), Grünau, 1 Ex. am 10.4.1997 ex larva aus Faulbaumast. **RL3**.
- Obera linearis* (L., 1761), Umg. Neuburg, 20.6.1988 und 2.7.1999 je 1 Ex. von Haselnuss geklopft.
- Obera pupillata* (GYLL., 1817), Bruck, 4.5.2000, 1 Ex. auf Geißblatt. **RL3**.
- Obera erythrocephala* (SCHRK., 1776), Freinhausen, 30.5.1990, Trockenhang, in Anzahl von Wolfsmilch gekeschert, ebendort J. ROPPEL bei der Gemeinschaftsexkursion der bayer. Coleopterologen am 14.6.1980. **RL2**.

### Chrysomelidae

- Donacia crassipes* F., 1775, Langenmosen, Donaumooskanal, 31.5.1993, 1 Ex. auf *Nuphar lutea*.
- Donacia thalassina* GERM., 1811, Schrobenhausen, 31.5.1991, 3 Ex. von *Carex* gekeschert.
- Donacia versicolorea* (BRAHM, 1790), Zuchering, Kleiner Teich, 5.6.1999, in Anzahl auf *Potamogeton natans*.
- Zeugophora frontalis* SUFFR., 1840, Schrobenhausen, 9.5.1990, 1 Ex. gekeschert. **RL2**.
- Lema cyanella* (L., 1758), Rohrenfeld, 16.8.2001, 1 Ex. auf *Carduus spec.* **RL3**.
- Smaragdina flavicollis* (CHARP., 1825), Neuburg, 30.6.1989, 1 Ex. von Haselnuß geklopft. **RL3**.
- Coptocephala unifasciata* (SCOP., 1763), Freinhausen, 21.7.1988, 4 Ex. auf Schirmblüten. **RL3**.
- Pachybrachis sinuatus* MULS. REY, 1859, Bergheim, 19.6.1989, in Anzahl von Birke geklopft und am 16.8.2001 1 Ex. an Weidengebüsch. **RL3**
- Cryptocephalus bilineatus* (L., 1767), Freinhausen, 21.7.1988, Kiesgrube, 10 Ex. gekeschert. **RL3**.
- Cryptocephalus nitidulus* F., 1787, Rohrenfeld, 21.6.1996, 1 Ex. gekeschert. **RL3**.
- Cryptocephalus punctiger* PAYK., 1799, Bergheim, 25.5.2001, 1 Ex. gekeschert. **RL2**.
- Cryptocephalus frenatus* LAICH., 1781, Bergheim, 23.6.1999, 3 Ex. an Weidengebüsch. **RL2**.
- Cryptocephalus quadripustulatus* Gyll., 1813, Brunnen, 28.6.1989, 1 Ex. gekeschert. **RL3**.
- Cryptocephalus populi* SUFFR., 1848, Freinhausen, 5.8.1989, in Anzahl von Pappel geklopft. **RL3**.
- Oomorplus concolor* (STURM, 1807), Rohrenfeld, 14.6.1996, 1 Ex. an Waldweg gekeschert.
- Pachnophorus pilosus* (ROSSI, 1790), Bergheim, 30.4.1998, Magerwiese, 6 Ex. auf schütter bewachsenen Stellen (Wegränder, Maulwurfshügel). **RL2**.
- Chrysolina rufoaeana* (SUFFR., 1851), Neustetten, 16.4.1994, 3 Ex. im Hochwassergenist einer überschwemmten Mooswiese. (det. KIPPENBERG). **RL2**.
- Phaedon laevigatus* (DUFT., 1825), Bergheim, 16.5.1999, in Anzahl im Hochwassergenist einer überschwemmten Kiesgrube. (det. KIPPENBERG).
- Prasocuris marginella* (L., 1758), Neuburg, 27.3.2002, 1 Ex. im Hochwassergenist der Donau.
- Tinarcha tenebricosa* (F., 1775), Neuburg, 30.5.1987, 4 Ex. im Gras am Donauradweg. **RL3**.
- Tinarcha metallica* (LAICH., 1781), Bergheim, 14.5.1999, 3 Ex. im Hochwassergenist der Donau.
- Longitarsus jacobaeae* (WTRH., 1858), Bergheim, 5.7.1999, 3 Ex. auf Kreuzkraut.
- Longitarsus agilis* (RYE, 1868), Schrobenhausen, 27.8.1999, 1 Ex. an Wiesengraben gekeschert. **RL2**.
- Longitarsus pulmonariae* WEISE, 1893, Schrobenhausen, 19.8.1997, in Anzahl an *Symphytum officinale*. **RL3**.
- Dibolia femoralis* REDT., 1849, Zuchering, 23.5.1998, 4 Ex. an *Salvia pratensis*. **RL3**.
- Dibolia rugulosa* REDT., 1849, Bergheim, 21.5.1998, 8 Ex. an *Stachys recta*. **RL3**.



*Dibolia depressiuscula* LETZN., 1846, Zuchering, 17.6.1998, Truppenübungsplatz, 1 Ex. gekeschert. **RL3**.  
*Cassida murraea* L., 1767, Gerolfing, 25.7.1993, Donauauwald, in Anzahl an *Inula* spec.  
*Cassida canaliculata* LAICH., 1781, Rohrenfeld, Magerwiese, 6.9.2000, 2 Ex. an den Rosettenblättern von *Salvia pratensis*, ebendort leg. F. Bauer. **RL3, W** (Alticinae det. DÖBERL).

### Anthribidae

*Tropideres albirostris* (HBST., 1783) Rohrenfeld, 10.6.1996, 1 Ex. an auf Waldlichtung gelagerter Eiche. Gerolfing, 7.6.1993, 1 Ex leg. BUSSLER unter den selben Fundumständen. **RL3**.  
*Enedreutes sepicola* (F., 1792), Brunnen, 5.8.1995, 1 Ex. von dünnen Ästen geklopft.  
*Rhaphitropis marchicus* (HBST., 1797), Rohrenfeld, 20.8.1996 und 3.7.1998 3 Ex. aus eingetragenen Eichen-ästen gezogen.  
*Choragus horni* WOLFR., 1930, Bergheim, Zell, am 20.6.1995 und 27.6.1996, 3 Ex. von dünnen Ästen geklopft. **RL2**.

### Scolytidae

*Scolytus pygmaeus* (F., 1787), Bergheim, 27.2.2000, 20.5.2000, zahlreich aus eingetragenen Ulmenästen gezogen. **Neufund für Bayern!**  
*Scolytus ratzeburgi* JANSON, 1856, Brunnen, 20.3.1997, 10 Ex. aus eingetragener Birkenrinde gezogen.  
*Xyleborus alni* NIJIMA, 1909, Zuchering, in Anzahl über mehrere Jahre an vom Sturm gefällten Espen, in Gesellschaft von *Obrivum cantharinum* (L.) und *Saperda perforata* (PALL.), 11.4.1998, 4.1999, 24.3.2000 (det. BÖHME). **Neufund für Bayern!**

### Cimberidae

*Doydirhynchus austriacus* (OL., 1807), Schrobenhausen, 13.5.1989 und 2.4.1997, 2 Ex. von blühenden Kiefern geklopft. **RL3**.

### Rhynchitidae

*Deporaus mannerheimii* (HUMMEL, 1823), Bergheim, 16.6.1999 und 21.6.1989, 2 Ex. an Waldrand geklopft.

### Apionidae

*Taphrotopium sulcifrons* (HBST., 1797), Freinhausen, 21.7.1988, 30.7.1988, 11.7.1989, 3 Ex. in Sandgrube gekeschert. **RL2**.

### Curculionidae

*Fourcartia squamulata* (HBST., 1795), Bergheim, 29.5.1999, 2 Ex. in Steinbruch gekeschert.  
*Sitona waterhousei* WALL., 1846, Langenmosen, 3.10.1990, 5 Ex. in Kiesgrube gekeschert. (det. Winkelmann). **RL3**.  
*Cyphocleonus dealbatus* (GMEL., 1790), Eichstätt, 11.9.1997, 1 Ex. auf Schafgarbe (Trockenhang). **RL3**.  
*Cotaster unciipes* (BOH., 1838), Neuburg, 12.5.1993, Auwald, in Anzahl aus Holz und Bodenstreu gesiebt. **RL3**.  
*Cossonus cylindricus* SAHLB., 1835, Hagau, 24.5.1997, in Anzahl in rotfaulem Holz einer hohlen Kopfweide. **RL3**.  
*Cossonus parallelepipedus* (HBST., 1795), Rohrenfeld, 31.12.1997, zahlreich in rotfaulem Holz einer hohlen Pappel. **RL3**  
*Bagous longitarsis* THOMS., 1868, Schrobenhausen, Waldteich, 18.5.1993, 6 Ex. von Ufervegetation gekeschert, Bergheim, Wiesenteich, am 22.12.2000 in Anzahl aus Ufergenist gesiebt, an *Myriophyllum spicatum* 2 Ex. am 26.5.2001. **RL3**.  
*Bagous luteiventris* (GYLL., 1813), Bergheim, 22.12.2000 Wiesenteich, 2 Ex. aus Ufergenist gesiebt.  
*Bagous subcarinatus* GYLL., 1836, Zuchering, kleiner Teich, am 17.-20.6.2000 und 6.7.2000 in Anzahl aus Ufergenist gesiebt. **RL3 W**.  
*Brachytentus porcatus* (GERM., 1824), Brunnen, 5.4.1992 und am 4.1.1998 zahlreich unter der losen Rinde von abgestorbenen Kiefern. **RL2**.  
*Notaris bimaculatus* (F., 1787), Neuburg, 27.3.2002, 3 Ex. im Hochwassergenist der Donau.  
*Thryogenes festucae* (HBST., 1795), Hagau, Waldteich, 1.5.1999 in Anzahl aus Carexblüten geklopft; vereinzelt in den Blüten von *Polygonum amphibium (natans)*, 6.7.2000 Kiesweiher, Zell.  
*Lignyodes enucleator* (PANZ., 1798), Schrobenhausen, 29.4.1994, 1 Ex. von Esche geklopft. Neuburg, 1.7.1989, 1 Ex. im Auwald gekeschert. **RL3**.  
*Tychius pumilus* Bris., 1862, Freinhausen, 6.8.1991 Kiesgrube, 3 Ex. an *Trifolium spec.* **RL3**.

- Sibinia subelliptica* (DESB., 1873) Freinhausen, 30.7.1988 2 Ex. in einer Kiesgrube gekeschert. **RL3**.  
*Anthonomus ulmi* (DEGEER, 1775), Umg. Neuburg, 22.6.1988 und 6.8.2000 2 Ex. im Auwald gekeschert.  
 (det. FRIESER).  
*Bradybatus kellneri* BACH, 1854, Rohrenfeld, 24.5.2000, 1 Ex. von Alleeahorn geklopft.  
*Curculio pellitus* (BOH., 1843), Umg. Neuburg, 9.5.1987, 1 Ex. von Eiche geklopft. **RL3**.  
*Curculio betulae* (STEPH., 1831), Schrobenhausen, 11.7.1990, 1 Ex. am Waldrand gekeschert.  
*Pissodes validirostris* (SAHLB., 1834), Brunnen, 13.3.2002, 1 Ex. auf Kiefernstumpf (Kahlschlag). **RL2**.  
*Pissodes piniphilus* (HBST., 1795), Langenmosen, 16.11.1994, 1 Ex. aus der Bodenstreu einer reistehenden Kiefer gesiebt.  
*Magdalis exarata* (BRIS., 1862), Schrobenhausen, 12.5.1989, 1 Ex. von Eiche geklopft. **RL2**.  
*Hylobius transversovittatus* (GOEZE, 1777), Wangen, 16.7.1992, 2.9.1990, 25.6.1990 je 1 Ex. von *Lythrum salicaria* geklopft. **RL3**.  
*Lepyrus capucinus* (SCHALL., 1783), Bergheim, Magerwiese, am 9.5.2002 in Anzahl an Brombeere, ebendort leg. F. BAUER.  
*Mitoplintus caliginosus* (F., 1775), vom 10.5.-18.5.2002 9 Ex. zusammen mit F. Bauer an den Juraausläufern bei Joshofen aus dem Fallaub und Bodenstreu von Eichen gesiebt. Begleitarten: *Acalles roboris* CURT., *A. camelus* (F.), *A. hypocrita* Boh.  
*Adexius scrobipennis* GYLL., 1834, Umg. Neuburg, 25.7.1993, 4 Ex. im Auwald aus Laub – und Bodens-treu gesiebt. **RL3**.  
*Hypera contaminata* (HBST., 1795), Freinhausen, 27.4.1989, 2 Ex. in Sandgrube gekeschert. **RL3**.  
*Dryophthorus corticalis* (PAYK., 1792) Hagau, 24.5.1997 15 Ex. unter der Rinde einer abgestorbenen Kiefer. leg. BUSSLER 2 Ex. am 1.3.1994, 15 Ex. am 6.10.1994 am Stammfuß einer morschen Kiefer. **RL3**.  
*Cryptorhynchus lapathi* (L., 1758), Schrobenhausen, 22.7.1988, 3 Ex. und am 13.5.1989, 1 Ex. von Weide und Birke geklopft.  
*Eubrychius velutus* (BECK., 1817), Bergheim, 22.12.2000, Wiesenteich, 30 Ex. aus Ufergenist gesiebt, am 26.5.2001, 2 Ex. im Wasser an *Myriophyllum spicatum*. Alter Nachweis wurde von L. BEHNE gemeldet, Dießen am Ammersee 21.6.1947, ENGELHARDT leg. **W**.  
*Phytobius leucogaster* (MARSH., 1802) Schrobenhausen, Waldteich, am 27.4.1993 an *Myriophyllum spicatum*, im Winter 2.12.1994 aus Ufermoos gesiebt, Zeller Kiesweiher, 19.6.1999 in der Blüte von *Polygonum amphibium* (*natans*).  
*Pelenomus canaliculatus* (FAHRS., 1843), Schrobenhausen, Waldteich, am 18.5.1993 von Ufervegetation gekeschert, im Winter 2.12.1994 aus Ufermoos gesiebt, gelegentlich in den Blüten von *Polygonum amphibium* (*natans*) 6.7.2000 Zuchering.  
*Rhinoncus henningsi* WAGN., 1936, Schrobenhausen, Paarwiese 6.10.1995, 10 Ex. unter den Rosettenblättern von *Polygonum bistorta*. **RL3**.  
*Rhinoncus inconspicuum* (HBST., 1795), Zuchering, 15.5. und 1.12.2000, 10 Ex. an kleinem Teich, aus Ufergenist gesiebt.  
*Rhinoncus albicinctus* GYLL., 1836, Zuchering, 5.7.2000, 17.7.2000, 25.7.2000 je 1 Ex. in den Blüten von *Polygonum amphibium* (*natans*). **RL3**.  
*Amalus scortillum* (HBST., 1795), Pobenhausen, 24.6.2000, Kiesgrube, 3 Ex. an *Polygonum aviculare*.  
*Thamniocolus viduatus* (GYLL., 1813), Gerolfing, 22.9.2001, 5 Ex. aus den Wurzelballen von *Stachys palustris* geklopft (an Gewässerrand).  
*Thamniocolus signatus* (GYLL., 1837), Zuchering, Truppenübungsplatz, vom 4.7.-12.7.2001, 9 Ex. an *Stachys recta*. **RL3**.  
*Phrydiuchus topiarius* (GERM., 1824), Rohrenfeld, 6.9.2000, 1 Ex. Magerwiese, unter den Rosettenblättern von *Salvia pratensis*. **RL3W**.  
*Ceutorhynchus roberti* GYLL., 1837, Schrobenhausen, 29.4.1994, 5 Ex. an *Alliaria officinalis*.  
*Datonychus urticae* (Boh., 1845), Bergheim, 25.5.2001, 1.8.2001, 2 Ex. an *Stachys sylvatica*. **RL3**.  
*Microplontus triangulum* (Boh., 1845), Schrobenhausen, Zuchering, 26.6.1991 und 4.7.2001, 5 Ex. von Schafgarbe geklopft. **W**.  
*Hadroplontus trimaculatus* (F., 1775), Bergheim, 5.7.1989 und 20.6.1995, 2 Ex. an Waldwegen von Distel geklopft. **RL3W**.  
*Mogulones raphani* (F., 1792), Schrobenhausen, 20.5.1989 und 23.5.1991 in Anzahl an *Symphytum officinale*. **Neufund für Bayern!**  
*Mogulones geographicus* (GOEZE, 1777), Zuchering, Truppenübungsplatz, 17.6.1998, 3 Ex. auf Natternkopf.

- Mogulones larvatus* (SCHLTZ., 1896), Neuburg, 20.5.1989, 30.6.1989, 17.7.1994 je 1 Ex. im Auwald gekeschert. **RL3**.
- Trichosirocalus horridus* (PANZ., 1801), Zuchering, Truppenübungsplatz, 4.7.2001, 3 Ex. und am 12.7.2001, 1 Ex. an *Cirsium spec.* **RL3 W**.
- Stenocarus ruficornis* (STEPH., 1831), Pobenhausen, 24.6.2000, Kiesgrube, 5 Ex. aus Mohnwurzelballen geklopft.
- Orobitis cyaneus* (L., 1758), Kochheim, 28.5.1995, 4 Ex. von *Viola spec.* gekeschert.
- Gynnetron rostellum* (HBST., 1795), Schrobenhausen, 22.6.1994, 1 Ex. gekeschert. **RL3**. leg. G. RÖSSLER 27.6.1992, Kallmünz. **W**.
- Rhynchaenus rufus* (SCHRK., 1781), Neuburg, 14.5.1988 und 16.6.2000 je 1 Ex im Auwald gekeschert. **RL3**.
- Rhynchaenus loniceræ* (HBST., 1795), Rennertshofen, 26.5.1989, 1 Ex. gekeschert. **RL3**.
- Pseudorcheses ermischii* (DIECKM., 1958), Bergheim, Trockenhang, 14.6.1998 in Anzahl gekeschert.
- Isochnus angustifrons* (WEST, 1917), Neuburg, 9.6.1989, zusammen mit *I. foliorum* (MÜLL.) je 1 Ex. gekeschert. (det. BEHNE).

Anschrift des Verfassers:

Erwin WEICHELBAUMER  
Dürerstr. 3  
D-86529 Schrobenhausen

## Aus der Münchner Entomologischen Gesellschaft

### Aufruf zur Mitarbeit am Projekt "Noctuiden Südostbayerns"

Die Großschmetterlingsfauna Bayerns ist –aufs Ganze gesehen – bekannt. Neue Artnachweise sind also nur noch vereinzelt (z.B. bei Zuwanderern oder bei neu definierten Arten) zu erwarten. Trotzdem ist unser Kenntnisstand sehr mangelhaft: Die tiefgreifenden Veränderungen unserer Landschaft in den letzten 50 Jahren durch Bebauung und Intensivierung der Landnutzung haben das Verbreitungsbild vieler heimischer Schmetterlingsarten stark verändert. Viele spezialisierte Arten haben Arealeinbußen hinnehmen müssen. Hinzu kommt, daß der Kenntnisstand auch in einer Zeit, in der das Sammeln von Schmetterlingen noch weiter verbreitet und nicht durch gesetzliche Restriktionen behindert wurde, regional sehr unterschiedlich war: Die Umgebung Münchens oder Regensburgs sowie Alpen und Alpenvorland zwischen Berchtesgaden und Garmisch waren z.B. gut erforscht, manch andere Gebiete Bayerns waren terra incognita. Die Situation hat sich seit der Verschärfung des Artenschutzrechtes verschlechtert: Die Zahl der Lepidopterologen, die noch bereit sind, in Bayern zu sammeln, geht laufend zurück. Da zudem die behördlichen Genehmigungen in der Regel auf kleine Gebiete beschränkt sind, fehlen vielerorts neue Daten.

Etwas besser sieht die Situation noch in Südostbayern aus: In den Räumen Altötting, Teisendorf/Freilassing, Traunstein, Rosenheim und Miesbach gibt es aktive Sammler, die auch mit Lichtfang Noctuidendaten erheben. Im Nationalpark Berchtesgaden wird derzeit die Nachtfalterfauna erforscht. Außerdem befinden sich in der Zoologischen Staatssammlung München (ZSM) bedeutende Sammlungen, die bis in die 80-er Jahre aus unserem Raum ergänzt wurden. Die Lepidopterologen Südostbayerns treffen sich regelmäßig zweimal im Jahr in Rohrdorf zu einem Vortragsabend mit Informationsaustausch. Insgesamt ergeben sich also gute Voraussetzungen für eine Erfassung der Noctuidenfauna Südostbayerns. Ich habe daher zusammen mit Emil SCHEURINGER 1998 begonnen, beim Treffen in Rohrdorf Datenerhebungsbögen zu verteilen. Der Datenrücklauf ist erfreulich. Etwa einmal im Jahr werden in Rohrdorf Zwischenergebnisse vorgetragen und im Nachrichtenblatt (zuletzt 52 (1/2) v. 15. Februar 2003 S. 39-40) hierüber berichtet. Ergänzend zu den Datenmeldungen werden die bereits in der ZSM befindlichen